

Complete esta tarjeta de información médica con la información de contacto de su médico o el de su hijo. Llévela consigo, o haga que su hijo la tenga consigo, mientras esté en tratamiento con BLINCYTO® (blinatumomab).



Doblar

Acerca de mí:

Nombre _____

Teléfono _____

Mi padre/madre o cuidador:

Nombre _____

Teléfono _____

Más información en www.BLINCYTO.com

Acerca de mi médico:

Nombre _____

Teléfono _____

Síndrome de liberación de citoquina y reacciones a la infusión

Los síntomas pueden incluir:

- Fiebre
- Cansancio o debilidad
- Mareo
- Dolor de cabeza
- Presión arterial baja
- Náuseas

Problemas neurológicos

Los síntomas pueden incluir:

- Pérdida de equilibrio
- Dificultad para hablar o habla arrastrada
- Dificultad con los movimientos faciales, la audición, la visión o la deglución
- Temblores

Las personas con síndrome de Down mayores de 10 años pueden tener un mayor riesgo de sufrir convulsiones a raíz del tratamiento con BLINCYTO®.

Tarjeta de información médica

El paciente está recibiendo BLINCYTO® (blinatumomab) para el tratamiento:

Complete esta tarjeta de información médica. Puede mantener su información de contacto de atención médica importante en un solo lugar aquí.

También se incluye información sobre algunos posibles efectos secundarios.



BLINCYTO® es una marca registrada de Amgen Inc. © 2023-2024 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-103-81700 08/24

¿QUÉ ES BLINCYTO® (blinatumomab)?

BLINCYTO® es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos y niños mayores de 1 mes con:

- Leucemia linfoblástica aguda (LLA) precursora de células B en remisión cuando solo queda una pequeña cantidad de células cancerosas en el organismo (enfermedad residual mínima)
- Leucemia linfoblástica aguda precursora de células B que ha reaparecido o no respondió a tratamientos previos
- LLA precursora de células B con cromosoma Filadelfia negativo en la fase de consolidación del tratamiento de quimioterapia con fases múltiples

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un cáncer de la sangre en el que un tipo particular de glóbulo blanco crece sin control.

No se sabe si BLINCYTO® es seguro y eficaz en niños menores de 1 mes de edad.



NOTA IMPORTANTE PARA PROFESIONALES DE LA SALUD:

No enjuague la vía de infusión de BLINCYTO® (blinatumomab) ni el catéter intravenoso, especialmente al cambiar las bolsas de infusión. Hacer esto al cambiar las bolsas o al finalizar la infusión puede generar una dosis excesiva y causar complicaciones. Cuando se administre a través de un catéter venoso multilumen, infunda BLINCYTO® (blinatumomab) a través de un lumen específico.

Si tiene alguna duda, comuníquese con el profesional que prescribe el medicamento.

BLINCYTO® (blinatumomab) puede causar efectos secundarios graves que pueden ser severos, potencialmente mortales o provocar la muerte, entre los que se incluyen:

Doblar

Doblar

Si tiene alguna duda, comuníquese con el profesional que prescribe el medicamento.

Consulte la [Información de Prescripción completa](#) de BLINCYTO®, incluidas las ADVERTENCIAS EN RECUADROS y la Guía del Medicamento.

Complete esta tarjeta de información médica con la información de contacto de su médico o el de su hijo. Llévela consigo, o haga que su hijo la tenga consigo, mientras esté en tratamiento con BLINCYTO® (blinatumomab).



Doblar



Acerca de mí:

Nombre

Teléfono

Mi padre/madre o cuidador:

Nombre

Teléfono

BLINCYTO® es una marca registrada de Amgen Inc.
© 2023-2024 Amgen Inc. Todos los derechos reservados.
USA-103-81700 08/24



También se incluye información sobre algunos posibles efectos secundarios.

Complete esta tarjeta de información médica. Puede mantener su información de contacto de atención médica importante en un solo lugar aquí.

El paciente está recibiendo BLINCYTO® (blinatumomab) para el tratamiento:

Tarjeta de información médica

¿QUÉ ES BLINCYTO® (blinatumomab)?

BLINCYTO® es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos y niños mayores de 1 mes con:

- Leucemia linfoblástica aguda (LLA) precursora de células B en remisión cuando solo queda una pequeña cantidad de células cancerosas en el organismo (enfermedad residual mínima)
 - Leucemia linfoblástica aguda precursora de células B que ha reparado o no respondió a tratamientos previos
 - LLA precursora de células B con cromosoma Filadelfia negativo en la fase de consolidación del tratamiento de quimioterapia con fases múltiples
- La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un cáncer de la sangre en el que un tipo particular de glóbulo blanco crece sin control. No se sabe si BLINCYTO® es seguro y eficaz en niños menores de 1 mes de edad.



NOTA IMPORTANTE PARA PROFESIONALES DE LA SALUD:

No enjuague la vía de infusión de BLINCYTO® (blinatumomab) ni el catéter intravenoso, especialmente al cambiar las bolsas de infusión. Hacer esto al cambiar las bolsas o al finalizar la infusión puede generar una dosis excesiva y causar complicaciones. Cuando se administre a través de un catéter venoso multilumen, infunda BLINCYTO® (blinatumomab) a través de un lumen específico.

Si tiene alguna duda, comuníquese con el profesional que prescribe el medicamento.

BLINCYTO® (blinatumomab) puede causar efectos secundarios graves que pueden ser severos, potencialmente mortales o provocar la muerte, entre los que se incluyen:

Síndrome de liberación de citoquina y reacciones a la infusión

Los síntomas pueden incluir:

- Fiebre
- Cansancio o debilidad
- Mareo
- Dolor de cabeza
- Presión arterial baja
- Náuseas
- Vómitos
- Escalofríos
- Hinchazón de la cara
- Sibilancia o dificultad para respirar
- Erupción cutánea

Problemas neurológicos

Los síntomas pueden incluir:

- Convulsiones
- Dificultad para hablar o habla arrastrada
- Pérdida de conciencia
- Dificultad para dormir
- Confusión y desorientación
- Pérdida de equilibrio
- Dolor de cabeza
- Dificultad con los movimientos faciales, la audición, la visión o la deglución
- Temblores

Las personas con síndrome de Down mayores de 10 años pueden tener un mayor riesgo de sufrir convulsiones a raíz del tratamiento con BLINCYTO®.

Acerca de mi médico:

Nombre

Teléfono

Más información en www.BLINCYTO.com

Doblar

Doblar

Si tiene alguna duda, comuníquese con el profesional que prescribe el medicamento. Consulte la [Información de Prescripción completa](#) de BLINCYTO®, incluidas las ADVERTENCIAS EN RECUADROS y la Guía del Medicamento.

Acerca de mí:

Nombre

Teléfono

Mi padre/madre o cuidador:

Nombre

Teléfono

BLINCYTO® es una marca registrada de Amgen Inc.
 © 2023-2024 Amgen Inc. Todos los derechos reservados.
 USA-103-81700 08/24

AMGEN®

También se incluye información sobre algunos posibles efectos secundarios.
 Complete esta tarjeta de información médica. Puede mantener su información de contacto de atención médica importante en un solo lugar aquí.

El paciente está recibiendo BLINCYTO® (blinatumomab) para el tratamiento:

Tarjeta de información médica

¿QUÉ ES BLINCYTO® (blinatumomab)?

BLINCYTO® es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos y niños mayores de 1 mes con:

- Leucemia linfoblástica aguda (LLA) precursora de células B en remisión cuando solo queda una pequeña cantidad de células cancerosas en el organismo (enfermedad residual mínima)
- Leucemia linfoblástica aguda precursora de células B que ha reaparecido o no respondió a tratamientos previos
- LLA precursora de células B con cromosoma Filadelfia negativo en la fase de consolidación del tratamiento de quimioterapia con fases múltiples

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un cáncer de la sangre en el que un tipo particular de glóbulo blanco crece sin control.

No se sabe si BLINCYTO® es seguro y eficaz en niños menores de 1 mes de edad.

 **BLINCYTO**®
 (blinatumomab) for injection
 35 mcg single-dose vial

Más información en www.BLINCYTO.com

Teléfono

Nombre

Acerca de mi médico:

Las personas con síndrome de Down mayores de 10 años pueden tener un mayor riesgo de sufrir convulsiones a raíz del tratamiento con BLINCYTO®.

- Convulsiones
- Pérdida de conciencia
- Dificultad para dormir
- Confusión y desorientación
- Dolor de cabeza
- Dificultad para hablar o habla arrastrada
- Pérdida de equilibrio
- Dolor de cabeza
- Dificultad con los movimientos faciales, la audición, la visión o la deglución
- Temblores

Problemas neurológicos

Los síntomas pueden incluir:

- Fiebre
- Conscio o debilidad
- Mareo
- Dolor de cabeza
- Presión arterial baja
- Náuseas
- Escalofríos
- Hinchazón de la cara
- Sibilancia o dificultad para respirar
- Erupción cutánea
- Vómitos

Síndrome de liberación de citoquina y reacciones a la infusión

Los síntomas pueden incluir:

BLINCYTO® (blinatumomab) puede causar efectos secundarios graves que pueden ser severos, potencialmente mortales o provocar la muerte, entre los que se incluyen:

Si tiene alguna duda, comuníquese con el profesional que prescribe el medicamento.

No enjuague la vía de infusión de BLINCYTO® (blinatumomab) ni el catéter intravenoso, especialmente al cambiar las bolsas de infusión. Hacer esto al cambiar las bolsas o al finalizar la infusión puede generar una dosis excesiva y causar complicaciones. Cuando se administre a través de un catéter venoso multilumen, infunda BLINCYTO® (blinatumomab) a través de un lumen específico.

NOTA IMPORTANTE PARA PROFESIONALES DE LA SALUD: