

Pronto dejará el hospital y continuará su tratamiento con BLINCYTO[®] en casa. Este formulario le brindará diferentes contactos e información adicional que puede consultar a lo largo de su tratamiento. **Su enfermera puede ayudarlo a llenarlo.** También pregunte acerca del Registro del Tratamiento del Paciente. Es un calendario que le ayudará a mantenerse organizado.

Tendrá atención médica y/o continuará el tratamiento de BLINCYTO[®] en una clínica de consulta externa.

Agencia de salud a domicilio (si aplica) _____ Número telefónico _____

Nombre de la enfermera de la salud a domicilio _____ Número telefónico _____

Clínica de consulta externa/centro de infusión (si aplica) _____

Dirección _____

Transporte hacia y desde la clínica _____ Número telefónico _____

Así como la asistencia durante el tratamiento de BLINCYTO[®] incluye a los seres queridos, también incluye a miembros de su equipo de atención médica en el hospital.

Nombre de la enfermera, trabajador social o el administrador del caso _____ Número telefónico _____

Puede dejar el hospital con una bomba portátil pequeña. Llene la siguiente sección en caso de que surja cualquier problema con su bomba.

Nombre de la marca de la bomba _____

Póngase en contacto para cualquier problema con la bomba _____ Número telefónico _____

Información del equipo

Bomba/problemas con la alarma

- **No cambie los ajustes** de su bomba de infusión, incluso si la alarma suena. Cualquier cambio de ajustes puede causar un error de dosis
- Llame a su proveedor de atención médica o enfermera de inmediato para cualquier problema relacionado con su bomba

Tipo de aguja IV _____

Cómo darle cuidado a su línea IV _____

Para mayor información visite www.BLINCYTO.com y para más información sobre asistencia financiera, visite www.amgenassist360.com.

INDICACIONES

BLINCYTO® (blinatumomab) es un medicamento de prescripción usado para tratar la leucemia linfoblástica aguda con precursor de células B (ALL) en pacientes que aún tienen rastros detectables de cáncer después de la quimioterapia.

La aprobación de BLINCYTO® en estos pacientes se basa en un estudio que midió la tasa de respuesta y la duración de la respuesta. Hay estudios en curso para confirmar el beneficio clínico.

BLINCYTO® (blinatumomab) es un medicamento de prescripción utilizado para tratar cierto tipo de leucemia linfoblástica aguda (ALL) en adultos y niños. La ALL es un cáncer de sangre y médula en el que un tipo en particular de glóbulo blanco se está replicando fuera de control.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre BLINCYTO®?

- **Llame a su proveedor de atención médica u obtenga atención médica de emergencia inmediatamente si tiene alguno de los síntomas enumerados a continuación:**
 - **BLINCYTO® puede causar efectos secundarios importantes que pueden ser graves, potencialmente mortales o causar la muerte, que incluyen:**
 - **Síndrome de liberación de citocinas (CRS) y reacciones a la infusión.** Los síntomas de CRS y las reacciones a la infusión pueden incluir: fiebre, cansancio o debilidad, mareo, dolor de cabeza, presión arterial baja, náusea, vómito, escalofríos, hinchazón de la cara, sibilancia o dificultad para respirar y sarpullido.
 - **Problemas neurológicos.** Los síntomas de problemas neurológicos pueden incluir: convulsiones, dificultad para hablar o balbuceo, pérdida de conciencia, problemas para dormir, confusión y desorientación, pérdida de equilibrio, dolor de cabeza y dificultad con los movimientos faciales, el oído, la visión o la deglución.
 - Su proveedor de atención médica revisará estos problemas durante el tratamiento con BLINCYTO®. Su proveedor de atención médica puede suspender temporalmente o por completo el tratamiento con BLINCYTO® si tiene efectos secundarios graves.

¿Quién no debe recibir BLINCYTO®?

- No reciba BLINCYTO® si es alérgico al blinatumomab o a cualquiera de los ingredientes de BLINCYTO®.

¿Qué debo evitar mientras recibo BLINCYTO®?

- No conduzca, opere maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas mientras recibe BLINCYTO®, ya que BLINCYTO® puede causar síntomas neurológicos tales como mareo, convulsiones y confusión.

Antes de recibir BLINCYTO®, informe a su proveedor de atención médica de todas sus condiciones médicas, incluso si usted o su hijo:

- tiene un historial de problemas neurológicos, tales como convulsiones, confusión, dificultad para hablar o pérdida de equilibrio
- tiene una infección
- ha tenido alguna vez una reacción a la infusión después de recibir BLINCYTO® u otros medicamentos
- tiene antecedentes de tratamientos de radioterapia al cerebro o quimioterapia
- está programado para recibir una vacuna. No debe recibir una "vacuna viva" dentro de las 2 semanas antes de iniciar el tratamiento con BLINCYTO®, durante el tratamiento y hasta que su sistema inmunitario se recupere, después de que reciba el último ciclo de BLINCYTO®. Si no está seguro del tipo de vacuna, consulte a su proveedor de atención médica.
- está embarazada o planea quedar embarazada. BLINCYTO® puede dañar al bebé nonato. Informe a su proveedor de atención médica si se embaraza durante el tratamiento con BLINCYTO®.

- Si hay posibilidad de que se embarace, su proveedor de atención médica debe realizar una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con BLINCYTO®.
- Las mujeres que tienen posibilidad de embarazarse deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con BLINCYTO®, y durante al menos 48 horas después de la última dosis de BLINCYTO®.
- está amamantando o planea amamantar. No se sabe si BLINCYTO® se transfiere a la leche materna. No debe amamantar durante el tratamiento con BLINCYTO® y durante al menos 48 horas después de su último tratamiento.
- **Informe a su proveedor de atención médica acerca de los medicamentos que toma, incluyendo los de prescripción y venta libre, vitaminas y complementos herbales.**
- **BLINCYTO® puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:**
 - **Infecciones.** BLINCYTO® puede causar infecciones que pueden causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente en caso de que presente signos o síntomas de una infección.
 - **Conteo bajo de glóbulos blancos (neutropenia).** La neutropenia es común con el tratamiento con BLINCYTO® y algunas veces puede ser potencialmente mortal. El conteo bajo de glóbulos blancos puede aumentar el riesgo de infección. Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre para revisar su conteo de glóbulos blancos durante el tratamiento con BLINCYTO®. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene fiebre.
 - **Prueba anormal de sangre en el hígado.** Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre para revisar su hígado antes de iniciar BLINCYTO® y durante el tratamiento con BLINCYTO®.
 - **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** La pancreatitis puede ocurrir en pacientes que reciben tratamiento con BLINCYTO® y corticoesteroides. Puede ser grave y causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene dolor abdominal intenso que no desaparece. El dolor puede presentarse con o sin náusea y vómito.
- Su proveedor de atención médica le realizará análisis de sangre durante el tratamiento para detectar efectos secundarios.
- Los efectos secundarios más comunes de BLINCYTO® incluyen:
 - Infecciones
 - Fiebre
 - Dolor de cabeza
 - Conteo bajo de glóbulos rojos (anemia)
 - Conteo bajo de glóbulos blancos (neutropenia)
 - Conteo bajo de glóbulos blancos con fiebre (neutropenia febril)
 - Conteo bajo de plaquetas (trombocitopenia)
 - Reacciones relacionadas con la infusión del medicamento como hinchazón de la cara, presión arterial baja y presión arterial alta (reacciones relacionadas con la infusión).
- Estos no son todos los efectos secundarios posibles de BLINCYTO®.
- Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoría médica sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.
- Por favor lea la Guía del medicamento adjunta antes de que usted o su hijo reciban BLINCYTO® y antes de cada infusión de BLINCYTO® y discútalas con su médico.

Por favor [haga clic aquí](#) para ver la Información de seguridad importante completa, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento para BLINCYTO®.