

Llene esta tarjeta de información médica con la información de contacto de su médico. Puede llevarla consigo mientras esté en tratamiento con BLINCYTO®.



Doble

<p>Sobre mí:</p> <p>Nombre _____</p> <p>Teléfono _____</p> <p>Mis padres o cuidador:</p> <p>Nombre _____</p> <p>Teléfono _____</p>	<p style="text-align: right;">Conozca más en www.BLINCYTO.com</p> <p>Teléfono _____</p> <p>Nombre _____</p> <p>Sobre mi médico:</p>
<p>Llene esta tarjeta de información médica. Puede mantener su información de contacto de atención médica importante en un solo lugar.</p> <p>También hay información sobre algunos efectos secundarios posibles.</p> <p>AMGEN</p> <p>BLINCYTO® es una marca registrada de Amgen Inc. © 2019 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-103-80409 9/19</p>	<p>Síndrome de liberación de citocinas y reacciones a la infusión</p> <p>Los síntomas pueden incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre • Cansancio o debilidad • Mareo • Dolor de cabeza • Presión arterial baja • Náusea <p>Problemas neurológicos</p> <p>Los síntomas pueden incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convulsiones • Dificultad para hablar o balbuceo • Pérdida de conciencia • Problemas para dormir <ul style="list-style-type: none"> • Vómito • Escalofríos • Hinchazón de la cara • Síbilancia o dificultad para respirar • Sarpullido <ul style="list-style-type: none"> • Confusión y desorientación • Pérdida de equilibrio • Dolor de cabeza • Dificultad con los movimientos faciales, el oído, la visión o la deglución
<p>Tarjeta de información médica</p> <p>El paciente está recibiendo BLINCYTO® para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda con precursor de células B en recaída o refractaria.</p> <p>BLINCYTO (blinatumomab) for injection 35 mcg single-dose vial</p>	<p>NOTA IMPORTANTE PARA LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN MÉDICA:</p> <p>No enjuague la línea de infusión de BLINCYTO® o el catéter intravenoso, especialmente al cambiar las bolsas de la infusión. Enjuagar cuando esté cambiando las bolsas o al finalizar la infusión puede resultar en una dosis excesiva y complicaciones.</p> <p>BLINCYTO® puede causar efectos secundarios importantes que pueden ser graves, potencialmente mortales o mortales, que incluyen:</p>

Doble

Doble